

سندرم حاد عروق قلب

به هر وضعیتی که به صورت ناگهانی منجر به کاهش جریان خون به قلب شود، سندرم کرونری حاد اطلاق می گردد. علائم می تواند در بر گیرنده نوعی احساس فشار و سنگینی در قفسه ی سینه باشد که در هنگام حمله قلبی رخ می دهد و درحالت استراحت و یا هنگام فعالیت سبک (انژین ناپایدار) هم وجود داشته باشد.

اوین علامت سندرم کرونری حاد حتی می تواند توقف ناگهانی قلب باشد. این سندرم اگر به موقع تشخیص داده شود، قابل درمان است و بسته به وضعیت سلامت عمومی بیمار و علائمی که بروز می یابد، درمان های متفاوتی خواهد داشت.

عموماً علائم و نشانه های سندرم کرونری حاد شبیه یک حمله قلبی است و در صورتی که به سرعت درمان نشود حمله ی قلبی رخ خواهد داد. بنابراین یک وضعیت **اورژانس** محسوب می شود و از آن جا که می تواند تهدید کننده حیات باشد، علائم آن باید جدی گرفته شوند.

در صورت بروز هر کدام از علائم زیر با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید:

- احساس درد، فشار، سنگینی یا سوزش در قفسه سینه
- تهوع، استفراغ
- تنگی نفس



- تعریق زیاد و ناگهانی
- احساس سبکی سر

برای رسیدن به مرکز درمانی خودتان رانندگی نکنید، بهتر است فرد دیگری شما را برساند.

ممکن است علائم و نشانه های حمله قلبی با توجه به سن، جنس، بیماری های زمینه ای مانند دیابت و... متفاوت باشد.

سایر علائم سندرم حاد کرونری عبارتند از:

- درد شکم
- سوزش سر دل
- سردرد، گیجی، غش کردن
- ضعف و بیحالی غیر معمول
- احساس بیقراری
- پوست مرطوب



اگر دچار دردی در ناحیه قفسه سینه می شوید که حالت عود شونده دارد، با پزشک خود مشورت کنید، چون ممکن است این دردها، شکلی از انژین صدری باشد.

درد قفسه سینه ی پایدار (stable Angina)

معمولاً قابل پیش بینی است. برای مثال با راه رفتن تند، ممکن است فرد دچار دردی در سینه شود که به محض استراحت از بین می رود.

درد قفسه سینه از نوع نا پایدار (Unstable Angina)

این نوع درد قابل پیش بینی نبوده و در حال استراحت هم ممکن است بوجود بیاید. این درد میتواند شدیدتر از نوع پایدار باشد.

سندرم کرونری حاد معمولاً ناشی از ایجاد پلاک در دیواره ی داخلی رگ ها، بوجود آمده و باعث تنگی و کند شدن جریان خون در آنها می شوند.

عوامل خطر در سندرم کرونری حاد:

این عوامل در بسیاری از بیماری های قلب و عروق مشترک هستند:

- سن بالای ۴۵ برای مردان و بالای ۵۵ برای زنان
- فشار خون بالا
- کلسترول (چربی خون) بالا
- کم تحرکی
- سیگار کشیدن
- دیابت نوع ۲
- سابقه فامیلی
- سابقه فشار خون و دیابت در دوران بارداری

سندرم حاد کرونری (A C S)

"حمله قلبی"



تهیه کننده: خدیجه علیزاده
سوپروایزر آموزش سلامت
بیمارستان امیرالمومنین چاراویماتی

منبع: برونر و سودارث و qrs بیماری های قلب

استرس را کنترل کنید .



منبع: برونر و سودارث

برخی تست های تشخیصی و درمانی :

نوار قلب، آزمایش خون، عکس قفسه سینه، تست ورزش،
اسکن هسته ای، آنژیوگرافی و...

برخی از درمان های دارویی :

داروی ضد انعقاد خون، نیتروگلیسرین، داروی پایین
آورنده کلسترول و...

اقدامات جراحی مانند آنژیوپلاستی و استنت گذاری و .

بیشگیری و خود مراقبتی :

- داشتن رژیم غذایی کم چرب
 - مصرف بیشتر میوه و سبزی تازه
 - محدود کردن مصرف نمک
 - انجام آزمایش کامل چربی خون
 - کنترل فشار خون و دیابت تحت نظر پزشک
 - داشتن تحرک بدنی، حداقل ۳۰ دقیقه روزانه
- برای مثال : ۳۰ دقیقه پیاده روی، ۵ روز در هفته با سرعت متوسط، کار در باغچه و غیره. می توان ۳۰ دقیقه رابه سه وعده ی ۱۰ دقیقه ای (صبح و ظهر و شب) تقسیم کرد.

از سیگار و الکل پرهیز کنید.

